Tıp Fakültesi

7. MARMARA PEDİATRİ KONGRESİ

20-22 ŞUBAT 2020

SHERATON GRAND İSTANBUL ATAŞEHİR

"Ciddi Sorunlara Kolay Çözümler"



BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

S-10

ÇOCUKLUK ÇAĞI İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA ERKEN BAŞLANGIÇ YAŞI FARKLILIK YARATIR MI?

Bilge Ş.Akkelle1, Özlem K. Şengül1, Burcu Volkan1, Engin Tutar1, Deniz Ertem1

Marmara Üniversitesi; Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme B.D.

Amaç: Son yıllarda, erken başlangıçlı inflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) tanısı alan olgu sayısındaki artış dikkati çekmektedir. Bu hasta popülasyonun klinik özellikleri ve hastalık seyri konusunda veriler kısıtlıdır. Çalışmamızda 10 yaş ve öncesinde İBH tanısı alan hastaların özelliklerinin değerlendirilmesi, verilerin 10 yaşından sonra tanı alan İBH hastaları ile karşılaştırılması hedeflenmiştir.

Metot: Çalışmamızda 2010-2019 yılları arasında tanı alan İBH tanılı hastalarımızın verileri değerlendirildi. Sınıflandırılamayan (unclassified) İBH tanılı ve monogenik defekti tespit edilen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar iki gruba ayrıldı (ÜK=ülseratif kolit, CH=Crohn hastalığı) ve İBH tanı yaşı esas alınarak veriler karşılaştırıldı. Hastalık aktiviteleri PCDAI (Pediatric Crohn´s Disease Activity Index) ve PUCAI (Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index) skorlamasına göre değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmada yer alan 141 hastanın %30.5'inde erken başlangıçlı (≤10) İBH saptandı. Bu oran ÜK hasta grubunda %36.7, CH hasta grubunda %22.5 idi. ÜK tanılı hastalarda %59.4 oranı ile kız, CH tanılı hastalarda ise %56.4 oranı ile erkek cinsiyet baskındı. Hastalık tutulumu ≤10 yaş ve > 10 yaş başlangıçlı ÜK hastalarında benzer özellikteydi. Orta ve ağır hastalık aktivitesine (PUCAI≥35) sahip hasta oranı >10 yaş başlangıçlı ÜK hasta grubunda daha yüksekti (%58 vs %28, p<0.05). Erken başlangıçlı ÜK hastalarında ekstraintestinal bulguların görüldüğü hasta oranı daha yüksekti (%31 vs %12, p<0.05). CH tanılı hastalarda tanı yaşına göre hastalık aktivitesinde fark saptanmadı. Erken başlangıçlı CH olgularının hiçbirinde tek başına ileum tutulumu görülmedi. Kolonik, ileokolonik ve üst gastrointestinal sistem tutulumu açısından ≤10 yaş ve >10 yaş başlangıçlı hasta grupları arasında fark saptanmadı ancak perianal tutulum oranı >10 yaş başlangıçlı hasta grubunda daha yüksekti (%61.9 vs %25, p<0.05). Gerek ÜK, gerekse CH tanılı hastalarda, tanı yaşı esas alınarak yapılan karşılaştırmada cinsiyet, aile öyküsü ve ebeveynlerde akraba evliliği oranı açısından istatistiksel fark saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamızın verileri İBH hastalarında tanı yaşına göre hastalık özelliklerinin değişkenlik gösterdiğini düşündürmektedir. Tedavi planının oluşturulmasında mevcut farklılıklar dikkate alınmalıdır.